

УДК 595.773.4

## **RHAGOLETIS BERBERIDIS (DIPTERA, TEPHRITIDAE, TRYPETINAE) — ПЕРША ЗНАХІДКА В ФАУНІ УКРАЇНИ**

**В. О. Корнеев**

Інститут зоології НАН України, вул. Б. Хмельницького 15, 252601 МСП Київ-30, Україна

Одержано 21 липня 1997

***Rhagoletis berberidis* (Diptera, Tephritidae, Trypetinae), the First Faunistic Record from Ukraine.** Korneyev V. A. — The black berberis fly described from Hungary and known by far from Switzerland, Austria and the North Caucasus was surprisingly found in the town of Kiev. A key to *Rhagoletis* species known from Ukraine is provided.

**К е у о р д с:** Tephritidae, *Rhagoletis*, Ukraine.

***Rhagoletis berberidis* (Diptera, Tephritidae, Trypetinae) — первая находка в фауне Украины.** Корнеев В. А. — Черная барбарисовая муха, описанная из Венгрии и на сегодняшний день известная из Швейцарии, Австрии и с Северного Кавказа, неожиданно обнаружена в Киеве. Дана таблица для определения видов *Rhagoletis*, известных в Украине.

**К л ю ч е в ы е с л о в а:** Tephritidae, *Rhagoletis*, Украина.

### *Rhagoletis berberidis* Jermy




Рис. 1. *Rhagoletis berberidis* (1, 2) і *Rh. cerasi* (3, 4): крило (1, 3) і середньощишка (2, 4).

Fig. 1. *Rhagoletis berberidis* (1, 2) and *Rh. cerasi* (3, 4): wing (1, 3) and mesonotum (2, 4).

Jermy, 1961: 136; Кандыбина, 1977: 159; Merz, 1994: 108.

М а т е р і а л: 9 ♂, ♀, "UKR., Київ, Lysa Hora" [Київ, урочище Лиса Гора, на *Berberis vulgaris* L.], 16-19.07.1997 (Korneyev).

Цей вид досить довго не відрізняли від вишневої мухи *Rhagoletis cerasi* L. через сильну збіжність в забарвленні тіла і рисунку крила. Попри сильну схожість, обидва види не є близько спорідненими, належачи до систематично дуже віддалених груп видів. Припускаючи можливість знахідки цього виду лише в передгір'ях Карпат.

автор несподівано знайшов його в межах міста Києва, на природоохоронній території урочища “Лиса Гора”, яке до 1985 р. лишалося недоторканим природним рефугіумом і зберегло чимало рідкісних видів рослин і тварин.

Сьогодні в Україні відомо 4 види плодових мух з роду *Rhagoletis* Lw. Їх можна розрізнити за допомогою наступної таблиці; до неї включено ще 4 види, відомі з суміжних територій.

Таблиця для визначення видів *Rhagoletis* фауни України і суміжних територій

**A key to species of *Rhagoletis* recorded from Ukraine and adjacent areas**

1. Середньоспинка і черевце жовто-гарячі до світло-брунатного ..... 2.  
— Середньоспинка і черевце чорне ..... 3.
2. Темна смужка, що проходить через жилку dm-cu (=tr), не досягає переднього краю крила. Личинки в ягодах барбарису (*Berberis vulgaris*) ..... *Rh. meigenii* Lw.  
— Темна смужка, що проходить через жилку dm-cu, досягає переднього краю крила. Личинки в плодах шипшини (*Rosa* sp.) ..... *Rh. alternata* Fl.
3. Інтеркалярна смужка на крилі (рис. 1, 2: і) добре розвинена ..... 4.  
— Інтеркалярна смужка не розвинена. [Види, досі не відомі з України.] ..... 5.
4. Темна смужка, що проходить вздовж вершини крила, не заходить назад за медіальну жилку (рис. 1). Щит середньоспинки без опилення. Щиток з чорним переднім краєм (рис. 2). Личинки в ягодах барбарису (*Berberis vulgaris*) ..... *Rh. berberidis* Jermy  
— Темна смужка, що проходить вздовж вершини крила, ясно заходить назад за медіальну жилку (рис. 3). Щит середньоспинки з сірватим опиленням. Щиток з жовтим переднім краєм (рис. 4). Личинки в черешнях і вишнях (*Prunus avium*, *P. cerasus*). В Західній Європі, європейській Росії та Казахстані зустрічається криптичний вид, що розвивається в плодах жимолості (*Lonicera caprifolium*) ..... *Rh. cerasi* Lw.
5. Темна смужка, що проходить вздовж вершини крила, відокремлена прозорим проміжком від його краю ..... 6.  
— Темна смужка, що проходить вздовж вершини крила, не відокремлена від його краю. Личинки в плодах жимолості (*Lonicera*) ..... 7.
6. Стегна жовті. Личинки в плодах ялівця (*Juniperus*). Кавказ, Туреччина, Середня Азія. .... *Rh. flavigenualis* Hering  
— Стегна (принаймні середні і задні) чорні. Личинки в плодах обліпихи (*Hippophae*). Голандія, Швейцарія, Росія (Алтай), Киргизія. .... *Rh. batava* Hering
7. Стегна жовті. Степова зона Росії, Ізраїль, Середня Азія ..... *Rh. flavicincta* Enderlein  
— Стегна чорні. Західна Європа (Німеччина) ..... *Rh. obsoleta* Hering

Каповыбина М. Н. Личинки плодовых мух-пестрокрылок (Diptera, Tephritidae). — Л.: Наука, 1977. — 212 с. (Определители по фауне СССР, издаваемые Зоологическим институтом АН СССР).

Jermy T. Eine Neue Rhagoletis-Art (Diptera: Tryptetidae) aus den Früchten von *Berberis vulgaris* L. // Acta. zool. Acad. sci. hung. — 1961. — 7, fasc. 1-2. — S. 133-137.

Merz B. Diptera, Tephritidae. — Genève, 1994. — 10 — 198 S. (Insecta Helvetica. Fauna).