

## ЗАМЕТКИ

---

*Argyreus hyperbius* (Linnaeus, 1763) (Lepidoptera, Nymphalidae) — первая находка в Российской Федерации.— Единственный экземпляр был добыт на побережье Японского моря в окр. пос. Глазковка 6.08.1992. Широко распространен в Гималаях, известен из Индии, Китая, Японии.— А. В. Бидзия (Институт зоологии НАН Украины, Киев).

Новые пестряки (Lepidoptera, Zygaenidae) для фауны Казахстана.— *Jordanita (Lucasiterna) solana* (Staudinger, 1887) — ♂ и ♀, «Казахстан, 30 км вост. Кентау, хр. Каратау, 12.05.1994, В. Золотухин». Ранее вид был известен из Узбекистана и Киргизии. *Adscita (Adscita) subdolosa* (Staudinger, 1887) — ♂, «mts. Kara-tau, pag. Vyssokoje (prov. Syg-darja), 5.06.1915, D. Rozhdestvenskij leg., coll. L. Sheljuzhko» (коллекция Зоологического музея Киевского университета). Ранее вид был известен из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Афганистана. По территории Казахстана проходят северная граница ареалов обоих видов.— К. А. Ефетов (Крымский медицинский институт, Симферополь).

---