

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

К вопросу о современном распространении клинтуха в Киевской области.— В настоящее время, согласно публикации В. М. Грищенко (1992), в Киевской области клинтух, за редким исключением, гнездится значительно севернее Киева. Однако по нашим, далеко не полным данным, он также гнездится и в спелых сосновых лесах вокруг Киева (в Святошинском лесопарковом хозяйстве, охватывающем город с запада и северо-запада, в Дарницком ЛПХ — с востока, в примыкающем с юга ЛПХ «Конча-Заспа»), и южнее его вплоть до Фастова (Боярское лесничество и др.). При этом в 1993 г. в Голосеевском лесу, где преобладают спелые лиственные древостой, и где клинтух сравнительно недавно был обычен (Владышевский, 1969; Мищенко, 1977), этот вид нами не был обнаружен. Следует отметить, что и в спелых дубняках, Святошинского и Дарницкого ЛПХ клинтух также не найден. Рекреационная нагрузка вряд ли является для него лимитирующим фактором, так как рассматриваемый вид устойчив к воздействию рекреации. Мы неоднократно наблюдали гнездящиеся пары клинтухов на участках леса на II и III стадиях рекреационной дигрессии. Так, в вышеупомянутых пригородных лесах, в спелых сосняках двух типов, наблюдалась следующая картина: в свежей дубово-сосновой субори — I ст. — 0,07 пар/га, II ст. — 0,15 пар/га, III ст. — 0,12 пар/га; в свежей грабово-сосновой судубраве — 0,11, 0,23 и 0,17 пар/га соответственно. Д. В. Владышевский (1969) также отмечает, что в 1968 г. в Голосеево, когда численность клинтухов была высока, они токовали даже над крышами домов.— **В. А. Костюшин** (Институт зоологии НАН Украины, Киев).