



## ЗАМЕТКА

---

**Новые виды совок (Lepidoptera, Noctuidae) фауны Одесской области (Украина) [The First Record of Noctuidae (Lepidoptera, Noctuidae) from Fauna Odessa Region (Ukraine)].** — В Нижнеднестровском природном парке ( $46^{\circ}25'51''$  N,  $30^{\circ}10'19''$ E) с 23.06 по 10.07.2009 зарегистрированы бабочки 5 видов совок: *Nola chlamitulalis* Hbn. ( $\sigma$ , 23.06), *Rhynchopalpus albula* Den. & Schiff. ( $\sigma$ , 23.06), *Aedia leucomelas* L. ( $\sigma$ , 26.06; 2  $\sigma$ , 9.07), *Eucarta virgo* Tr. (7  $\sigma$ , 2  $\varphi$ , 24.06–10.07), *Archanaea neurica* Hbn. ( $\sigma$ , 10.07) (собр. Халаим). Последний вид из названных отмечен также в с. Маяки (опр. Ключко). *A. leucomelas* встречается локально в Закарпатской обл. и Крыму (Ключко и др., 2001; Nowacki, Bidychak, 2009). *Eucarta virgo* предпочитает влажные местообитания близ рек и других водоемов в Карпатах, также в дельте Дуная (Ключко, 1963; Rakosy, 1997). *Schränkia costaestrigalis* Steph. — редкий транспалеарктический вид, самка обнаружена на берегу озера Кагул близ с. Нагорное Ренийского р-на 23.06.2008 (собр. Халаим, opr. Ключко). В окр. с. Любомирка Котовского р-на 22.07.2009 обнаружены 2  $\sigma$ , один относится к типично степному виду *Cucullia dracunculi* Hbn., второй — обитатель разреженных лесов *Papestra biren* Goeze (собр. Халаим, opr. Ключко). Ближайшее местообитание *P. biren* — окр. г. Залещики Тернопольской обл. (Kremky, 1937). До сих пор в Одесской обл. были отмечены 348 видов, в Северном Причерноморье — 419 (Ключко, Матов, Халаим, 2009), ныне насчитывается соответственно 356 и 426 видов совок. — З. Ф. Ключко (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев), Е. В. Халаим (Одесский национальный университет им. И. И. Мечникова).