



<http://dx.doi.org/10.15407/ukrbotj72.04.340>

Г.В. БОЙКО, В.П. КОЛОМІЙЧУК

Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України
вул. Терещенківська, 2, м. Київ, 01004, Україна
bav22@ukr.net, vkolomiychuk@ukr.net

ДОПОВНЕННЯ ДО ФЛОРИ ПІВNІЧНОГО УЗБЕРЕЖЖЯ АЗОВСЬКОГО МОРЯ

Бойко Г.В., Коломійчук В.П. Доповнення до флори північного узбережжя Азовського моря. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(4): 340—343.

Повідомляється про знахідки нових і малопоширеніших для північної частини берегової зони Азовського моря адвентивних (*Alcea rosea* L., *Amaranthus hypochondriacus* L., *Artemisia annua* L., *Catalpa bignonioides* Walter, *Celtis occidentalis* L., *Coreopsis tinctoria* Nutt., *Datura inoxia* Mill., *Dryopteris cristata* (L.) A. Gray, *Gaillardia × grandiflora* hort. ex Van Houtte, *Grindelia squarrosa* (Pursh.) Dunal, *Lycopersicon esculentum* Mill., *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., *Petrosedum reflexum* (L.) Grulich, *Petunia × atkinsiana* (Sweet) D. Don ex W.H. Baxter, *Persica vulgaris* Mill., *Reynoutria japonica* Houtt., *Syringa vulgaris* L., *Vitis vinifera* L., *Xanthium ripicola* Holub, *Xanthoxalis corniculata* (L.) Small) та раритетного (*Glaucium flavum* Crantz.) видів рослин. Наведено характеристику їхніх місцезростань.

Ключові слова: Азовське море, берегова зона, флора, адвентивні види, раритетні види

Північна частина берегової зони Азовського моря є найдовшою серед інших. Її протяжність із заходу на схід — близько 360 км. Флора цієї території станом на 2012 р. нараховувала 1189 видів судинних рослин із 88 родин (Kolomiychuk, 2012), нині цей список постійно поповнюється (Kolomiychuk et al., 2013).

Під час польових обстежень упродовж 2013—2014 рр. у межах Донецької, Запорізької та Херсонської областей виявлено 11 нових для північного узбережжя Азовського моря видів рослин. Для 21 виду (чужорідних і малопоширеного аборигенного) вказані нові місцезростання в межах досліджуваної зони. 19 із наведених таксонів зафіксовано вперше для окремих адміністративних одиниць України. Значну частку серед них становлять чужорідні види, які дичавіють із культури.

Літерами перед назвою позначені таксони, котрі, за нашим даними, вперше зафіксовано для північної частини берегової зони Азовського моря (А), Запорізької (З) області, м. Бердянська (Б); перед адвентивними видами поставлено значок «♦». Автори зборів вказані за ініціалами (Г. Б. — Г.В. Бойко, В. К. — В.П. Коломійчук).

© Г.В. БОЙКО, В.П. КОЛОМІЙЧУК, 2015

♦^б*Alcea rosea* L. — ергазіофіт, кенофіт східземноморського походження. Наводився для околиць м. Генічеська та берегів Міуського лиману (Kolomiychuk, 2012). Нове місцезнаходження: м. Бердянськ, набережна, вздовж залізничної колії з порту (13.07.2014, Г. Б.).

♦^{з^б}*Amaranthus hypochondriacus* L. — ергазіофіт, кенофіт північноамериканського походження. Раніше був відомий лише для урболандшафтів Таганрога та Маріуполя (Gumech, 1985; Burda, 1997). У 2013 р. знайдений нами в Казантіпському природному заповіднику (балка Сенькіна, поодинокі екземпляри, 19.09.2013, В. К.), а влітку 2014 р. — у м. Бердянську (мікрорайон Ліски, одноповерхова забудова, збій вздовж дороги, зрідка, 13.08.2014, Г. Б.).

♦^б*Artemisia annua* L. — аколютофіт (у досліджуваному регіоні), кенофіт східноазійського походження, відомий на північному узбережжі Азовського моря з м. Маріуполя (Burda, 1997; Boyko, 2001). Нові місцезнаходження виду ми виявили в Бердянську, де він спорадично трапляється по всьому місту; найчастіше зростає у тіністих місцях під стінами будинків або на занедбаних газонах, деколи масово, до кількох десятків особин на 1 м² (17.07.2014,

Г. Б.). Окремий локалітет зафіковано на піщаному березі моря (пляж Лазурний-2, 15.08.2014, Г. Б.). За нашими даними, це друге для Запорізької обл. місце знаходження виду; вперше він знайдений на о-ві Хортиця у 1993 р. (Tarasov, 2012). Ми вважаємо, що насправді вид розповсюджений у регіоні значно ширше, однак не фіксувався дослідниками.

♦^{a3b}*Catalpa bignonioides* Walter — ергазіофігіфт, кенофіт північноамериканського походження. У м. Бердянську виявлено декілька локалітетів із віргинільними рослинами різного віку, які зростали здебільшого в щілинах біля парканів і будинків (13.08.2014, Г. Б.).

♦^b*Celtis occidentalis* L. — ергазіофігіфт, кенофіт північноамериканського походження. Раніше наводився нами для схилів Молочного лиману та промислових майданчиків міст Таганрога і Маріуполя (Kolomiychuk, 2012). Нині зафіковане його здичавіння у м. Бердянську (18.08.2014, Г. Б.).

♦^{a3b}*Coreopsis tinctoria* Nutt. — ергазіофігіфт, кенофіт північноамериканського походження. Знайдений у м. Бердянську (одноповерхова забудова, в щілині біля стіни будинку, поодинока рослина, 16.08.2014, Г. Б.).

♦^{3b}*Datura innoxia* Mill. — ергазіофігіфт, кенофіт південноамериканського походження. На північному узбережжі Азовського моря вперше виявлений на околицях с. Мелекіне Мангуського р-ну Донецької обл. (Kuskov, Burda, 1989). У 2013 р. нами зафікована локальна популяція виду (налічує до 30 екземплярів на площі 15 м²) на косі Бірючий острів (околиці с. Садки, смтник, 22.08.2013, В. К.). У 2014 р. вид відзначено для м. Бердянська (р-н Ліски, одноповерхова забудова, збій вздовж дороги, локально, масово, 13.08.2014, Г. Б.).

♦^{a3b}*Dryopteris cristata* (L.) A. Gray — голарктичний гемістенотопний вид, що зазвичай трапляється на вогких і заболочених місцях у лісах та серед чагарників. Уперше наводиться для північного узбережжя Азовського моря. У нашому випадку, вірогідно, має заносний характер, про що свідчить його зростання в рудеральному екотопі біля морського порту. Рослину виявлено в щілині між бетонними щаблями будівлі, в якій розташований пост екологічного контролю в пункті пропуску через Державний кордон «Бердянський МТП» (м. Бердянськ, 11.08.2014, Г. Б., det.: О.О. Безсмертна). Оскільки рослина зібрана без сорусів, ми не до кінця впевнені в тому, що зразок визначено правильно.

♦^{a3b}*Gaillardia × grandiflora* hort. ex Van Houtte — ергазіофігіфт, кенофіт північноамериканського походження (м. Бердянськ, вул. Котляревського, занедбаний газон, 18.08.2014, Г. Б.). Виявлено на значній відстані від можливих місць культивування.

Glaucium flavum Crantz. — європейсько-середземноморський стенотопний геміапофіт, занесений до третього видання «Червоної книги України», «Красной книги Приазовского региона», Червоних книг і регіональних списків Російської Федерації (Novosad, Krytska, 2009; Kraynuk et al., 2012). Вірогідно, вперше для північного узбережжя Азовського моря наводився О. Л. Вержбицьким (Vergbitskiy, 1892). До останнього часу на цій території вважався зниклим (Kondratuk et al., 1985). Знайдений нами в травні 2014 р. на авандюні косі Бірючий острів (Азово-Сиваський національний природний парк, урочище «Перетяга», 29.05.2014, В. К.). Популяція представлена двома локалітетами, розташованими в межах асоціації *Leymeto (sabulosae) cramboso (pontici)*. Усього на двох ділянках площею 0,2 га нами зафіковано 56 рослин у фазі квітування. У плані заходів щодо охорони раритетного фіторізноманіття Азово-Сиваського НПП на 2015 р. міститься завдання з охорони місцезростань цього субліторального рідкісного виду шляхом їхньої часткової огорожі.

♦^b*Grindelia squarrosa* (Pursh.) Dunal — аколютофіт (переважно), кенофіт північноамериканського походження. У північній частині берегової зони Азовського моря його популяції фіксують з кінця 70-х років ХХ ст. У м. Бердянську вид має численні локалітети (ландшафтний заказник «Оголовок Бердянської коси», біля приватної новобудови, масово; вздовж автошляху на Середній косі поблизу старого порту, 05.08.2014, Г. Б.; вздовж залізничних колій, локально; центральна частина міста — занедбані газони, щілини дорожнього покриття тощо, часто, 16.08.2014, Г. В.). Подекуди в місті спостерігається активне розселення виду, наприклад, на вул. Рози Люксембург він зростає на більшості придатних ділянок.

♦^{a3b}*Lycopersicon esculentum* Mill. — ергазіофігіфт, кенофіт, походження не з'ясоване, найімовірніше, південноамериканське. Рослина знайдена в м. Бердянську неподалік порту (вул. Горького, газон), 13.07.2014, Г. Б.

♦^b*Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch. — ергазіофігіфт, кенофіт північноамериканського похо-

дження. Бердянськ, набережна, залишки будівельних відходів, 10.07.2014, Г. Б.

♦^{3Б}*Petrosedum reflexum* (L.) Grulich (*Sedum reflexum* L.) — ергазіофігіфіт, кенофіт європейського (найімовірніше — центральноєвропейського) походження (Boiko, Mulienkova, 2014). Раніше наводився для парків м. Таганрога (Kolomiychuk, 2012). Знайдена популяція в м. Бердянську бере початок на міському кладовищі № 1, звідки за низкою послідовних локалітетів можна простежити «втечу» з місць культивування. Рослина зростає у щілинах кам'яної кладки, між бордюрами та плитами, по схилу степового збою до автомобільного шляху. Діаспори, вочевидь, розповсюджуються потоками дощової і талої води (13.08.2014, Г. Б.).

♦^{4ЗБ}*Petunia × atkinsiana* (Sweet) D. Don ex W.H. Baxter — ергазіофігіфіт, кенофіт південноамериканського походження. У м. Бердянську знайдено декілька локалітетів по кілька рослин у кожному (занедбані газони, щілини в дорожньому покритті тощо, 11,15.08.2014, Г. Б.).

♦^{4ЗБ}*Persica vulgaris* Mill. — ергазіофігіфіт, кенофіт східноазійського походження. Рослина, що плодоносить, виявлена у м. Бердянську біля залізничної колії, неподалік одноповерхової забудови, 18.08.2014, Г. Б.

♦^{5Б}*Reynoutria japonica* Houtt. — ергазіофігіфіт, кенофіт східноазійського походження. Вперше був зібраний у 1905 р. аматором Й.К. Бойком (KW 078546) у с. Преслав за 10 км від Ногайська (нині Приморськ) (Shumilova, Fedorochuk, 2013). За місцем збору — Преславська ферма — неможливо зрозуміти, зростала рослина в культурі чи здичавіла. Ми вперше зібрали екземпляри виду на смітниках у припортовій зоні м. Маріуполя в 2012 р. (Kolomiychuk, 2012). У 2014 р. відзначений для приморської смуги м. Бердянська (Бердянськ, вул. Підгірна, 04.10.2014, В. К.).

♦^{6АБ}*Syringa vulgaris* L. — ергазіофігіфіт, кенофіт балканського походження. Кількарічна молода рослина (найімовірніше, насінневого походження), знайдена в м. Бердянську (вул. Котляревського, біля бетонного перекриття над трубопроводом, 18.08.2014, Г. Б.).

♦^{7АБ}*Vitis vinifera* L. — ергазіофігіфіт, кенофіт культивованого походження. Багаторічна рослина, що активно плодоносить, знайдена в м. Бердянську (вул. Котляревського, біля бетонного перекриття над трубопроводом, 18.08.2014, Г.Б.).

♦^{8А}*Xanthium ripicola* Holub — кенофіт центрально-європейського походження. У Приазов'ї донедавна був відомий лише з коси та о-ва Тузла (Kolomiychuk, 2012). Нове місцезнаходження — Донецька обл., Мангуський р-н, околиці с. Юр'ївка, пансіонат «Металург», берег моря, піщані дюни, популяції чисельні (в окремих місцях — до 3—7 екземплярів на 1 м², 04.10.2014, В. К.).

♦^{9АБ}*Xanthoxalis corniculata* (L.) Small — кенофіт середземноморсько-передньоазійського походження. Раніше для берегової зони не наводився. Вперше виявлений нами влітку 2013 р. у припортових екотопах м. Бердянська. Того ж року вид зафіксований на території Азово-Сиваського національного природного парку (коса Бірючий острів, с. Садки, тріщини фундаменту амбулаторії, 22.08.2013, В. К.).

Гербарні збори передані до Національного гербарію Інституту ботаніки імені М. Г. Холодного НАН України (KW). Дублетні зразки зберігаються в науковому гербарії кафедри ботаніки та садово-паркового господарства Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького (MELIT) та Гербарії Донецького ботанічного саду НАН України (DNZ).

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Boiko G.V., Mulienkova O.G. *Invasionnaya biologiya: современное состояние и перспективы: материалы рабочего совещания (Invasion biology: current state and prospects: the workshop materials)*, Moscow: MAKS Press, 2014, pp. 30–33 [Бойко А.В., Муленкова Е.Г. *Petrosedum reflexum* (L.) Grulich на территории Донецкой области (Украина) // *Инвазионная биология: современное состояние и перспективы: мат-лы раб. совещ.* (Москва, 10–13 сент. 2014 г.). — М.: МАКС Пресс, 2014. — С. 30–33].

Boyko A.V. *Bioriznomanittra pryrodn. i tekhnogennych biotopiv v Ukraini: materialy vseukrainskoi konferentsiyi studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh*, Donetsk: Vyd-vo DonNU, 2001, part 1, pp. 116–119 [Бойко А.В. *Artemisia annua* L. во флоре Украины // *Біорізноманіття природн. і техногенних біотопів в Україні: мат-ли Всеукр. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених* (Донецьк, 19–22 лист. 2001 р.). — Донецьк: Вид-во ДонНУ, 2001. — Ч. 1. — С. 116–119].

Burda R.I. *Anotovanyi spysok flory promyslovykh mist na Pivdennomu shkodi Ukrayini*, Donetsk, 1997, 49 p. [Бурда Р.І. *Анотований список флори промислових міст на Південному сході Україні*. — Донецьк: Б.в., 1997. — 49 с.].

Gumech V.S. *Introduktsiya i akklimatizatsiya rasteniy*, 1985, vol. 3, pp. 25–30 [Гумеч В.С. *Новые и редкие аддентивные растения приморской полосы север-*

- ного Приазовья // *Интродукция и акклиматизация растений*. — 1985. — Вып. 3. — С. 25—30].
- Kolomyichuk V.P. *Konspekt flory sosudistykh rasteniy beregovooy zony Azovskogo morya*. Ed. T.L. Andrienko, Kyiv: Alterpress, 2012, 300 p. [Коломийчук В.П. *Конспект флоры сосудистых растений береговой зоны Азовского моря* / Ред. Т.Л. Андриенко. — К.: Альтерпрес, 2012. — 300 с.].
- Kolomyichuk V.P., Polshina T.N., Maltseva S.Yu. *Promyshlennaya botanika (Industrial Botany)*, 2013, vol. 13, pp. 50—52 [Коломийчук В.П., Польшина Т.Н., Мальцева С.Ю. Дополнения к флоре береговой зоны Азовского моря // *Промышленная ботаника*. — 2013. — Вып. 13. — С. 50—52].
- Kondratyuk E.N., Burda R.I., Ostapko V.M. *Konspekt flory yugo-vostoka Ukrayny. Sosudystye rasteniya*, Kiev: Naukova Dumka, 1985, 272 p. [Кондратюк Е.Н., Бурда Р.И., Остапко В.М. *Конспект флоры юго-востока Украины. Сосудистые растения*. — Киев: Наук. думка, 1985. — 272 с.].
- Kraynyuk E.S., Vakhrusheva L.P., Lytvynskaya S.A., Brovko Yu.V. *Glaucium flavum* Crantz. In: *Krasnaya knyga Pryazovskogo reyona. Sosudystye rastenyua*. Eds V.M. Ostapko, V.P. Kolomyichuk, Kiev: Alterpress, 2012, pp. 235—237 [Крайнюк Е.С., Вахрушева Л.П., Литвинская С.А., Бровко Ю.В. *Glaucium flavum* Crantz. / *Красная книга Приазовского региона. Сосудистые растения* / Ред. В.М. Остапко, В.П. Коломийчук. — Киев: Альтерпрес, 2012. — С. 235—237].
- Kuskov A.Ye., Burda R.I. *Ukr. botan. zhurn.*, 1989, 46(2), pp. 64—65 [Кусков А.Е., Бурда Р.И. Знайдка *Datura meteloides* DC. — нового для флори УРСР виду // *Укр. ботан. журн.*. — 1989. — 46(2). — С. 64—65].
- Novosad V.V., Krytska L.I. *Glaucium flavum* Crantz. In: *Chervona knyha Ukrayny. Roslynnyi svit (Red Data Book of Ukraine. Vegetable Kingdom)*, Kyiv: Globalkonsaltyng, 2009, p. 538 [Новосад В.В., Крицька Л.І. Мачок жовтий (*Glaucium flavum* Crantz.) / *Червона книга України. Рослинний світ* / Ред. Я.П. Дідух. — К.: Глобалконсалтинг, 2009. — С. 538].
- Ostapko V.M. *Raritetniy florofond yugo-vostoka Ukrayny (khorologiya)*, Donetsk: Lebed, 2001, 121 p. [Остапко В.М. *Раритетный флорофond юго-востока Украины (хорология)*. — Донецк: Лебедь, 2001. — 121 с.].
- Shumilova A.V., Fedorovichuk N.S. *Herbarium of J.K. Bojko*, Kyiv: Alterpress, 2013, 188 p. [Шумілова А.В., Федорончук Н.С. *Гербарій Й.К. Бойка*. — К.: Альтерпрес, 2013. — 188 с.].
- Tarasov V.V. *Flora Dnepropetrovsk and Zaporozhye regions. Vascular plants with their biology-ecological characteristic*, Dnepropetrovsk: Lira, 2012, 296 p. [Тарасов В.В. *Флора Дніпропетровської та Запорізької областей. Судинні рослини* / 2-е вид. — Дніпропетровськ: Лира, 2012. — 296 с.].
- Verzhbitskiy O.L. *Zametki o flore goroda Mariupolya i ego okrestnostey*, Mariupol, 1892, Appendix, pp. 454—456 [Вержбицкий О.Л. *Заметки о флоре г. Мариуполя и его окрестностей*. — Мариуполь, 1892. — Приложение. — С. 454—456].
- Рекомендує до друку
М.М. Федорончук
- Надійшла 02.07.2015 р.
- Бойко А.В., Коломийчук В.П. *Дополнение к флоре северного побережья Азовского моря*. — Укр. ботан. журн. — 2015. — 72(4): 340—343.
- Институт ботаники имени Н.Г. Холодного НАН Украины
ул. Терещенковская, 2, г. Киев, 01004, Украина
- Сообщается о находках новых и малораспространенных для северной части береговой зоны Азовского моря адвентивных (*Alcea rosea* L., *Amaranthus hypochondriacus* L., *Artemisia annua* L., *Catalpa bignonioides* Walter, *Celtis occidentalis* L., *Coreopsis tinctoria* Nutt., *Datura inoxia* Mill., *Dryopteris cristata* (L.) A. Gray, *Gaillardia × grandiflora* hort. ex Van Houtte, *Grindelia squarrosa* (Pursh.) Dunal, *Lycopersicon esculentum* Mill., *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., *Petrosedum reflexum* (L.) Grulich, *Petunia × atkinsiana* (Sweet) D. Don ex W.H. Baxter, *Persica vulgaris* Mill., *Reynoutria japonica* Houtt., *Syringa vulgaris* L., *Vitis vinifera* L., *Xanthium ripicola* Holub, *Xanthoxalis corniculata* (L.) Small) и раритетного (*Glaucium flavum* Crantz.) видов растений. Приведена характеристика их местопроизрастаний.
- Ключевые слова: Азовское море, береговая зона, флора, адвентивные виды, раритетные виды.
- Boiko G.V., Kolomyichuk V.P. *Addition to the flora of the northern coast of the Sea of Azov*. — Ukr. Bot. J. — 2015. — 72(4): 340—343.
- M.G. Kholodny Institute of Botany, National Academy of Sciences of Ukraine
2, Tereshchenkivska Str., Kyiv, 01004, Ukraine
- New and uncommon for the northern coast of the Sea of Azov alien plant species (*Alcea rosea* L., *Amaranthus hypochondriacus* L., *Artemisia annua* L., *Catalpa bignonioides* Walter, *Celtis occidentalis* L., *Coreopsis tinctoria* Nutt., *Datura inoxia* Mill., *Dryopteris cristata* (L.) A. Gray, *Gaillardia × grandiflora* hort. ex Van Houtte, *Grindelia squarrosa* (Pursh.) Dunal, *Lycopersicon esculentum* Mill., *Parthenocissus quinquefolia* (L.) Planch., *Petrosedum reflexum* (L.) Grulich, *Petunia × atkinsiana* (Sweet) D. Don ex W.H. Baxter, *Persica vulgaris* Mill., *Reynoutria japonica* Houtt., *Syringa vulgaris* L., *Vitis vinifera* L., *Xanthium ripicola* Holub, *Xanthoxalis corniculata* (L.) Small) and a rare species (*Glaucium flavum* Crantz.) are reported. The characteristics of their habitats are provided.
- Ключевые слова: Sea of Azov, coastal zone, flora, alien plants, rare plants.