

УДК 594.3(477.8)

ОБЗОР ФАУНЫ И ЭКОЛОГИИ ПРЕСНОВОДНЫХ БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ (GASTROPODA) ЗАПАДНЫХ ОБЛАСТЕЙ УКРАИНЫ

А. П. Стадниченко

(Астраханский технический институт рыбной промышленности и хозяйства)

Брюхоногие моллюски (Gastropoda) обычны в гидрофауне западных областей Украины. Гастроподы играют немаловажную роль в общей трофической цепи водяного населения, в то же время они являются облигатными промежуточными хозяевами личиночных форм трематод, поэтому понятен интерес к их изучению. В литературе имеется ряд работ, посвященных пресноводным гастроподам западных областей Украины (Zawadski, 1852*; Jachno, 1870; Król, 1877; Bakowski, 1878—1883, 1885; Kotula, 1881, 1884; Clessin, 1887; Dybowski, 1898; Lindholm, 1908; Babog, Frankenberger, 1914; Poliński, 1917; Жадин, 1929; Полянский, 1932; Urbański, 1933; Adamowicz, 1937, 1939; Гитилис, 1952; Путь, 1957; Здун, 1958, 1962, 1963; Черемисина, 1959; Кузьмович, 1963, 1968; Иванчик, 1964, 1965). Однако несмотря на то, что за последние 150 лет моллюски западных областей Украины неоднократно были объектом исследования, степень изученности их нельзя считать удовлетворительной. Во-первых, нет работ, посвященных фауне пресноводных гастропод всех западных областей УССР. Во-вторых, невыясненными остались видовой состав и особенности распространения брюхоногих моллюсков в водоемах различных природно-географических зон западных областей УССР. Наконец, очень мало работ, освещавших особенности экологии гастропод в водоемах названной территории (Bakowski, Lomnicki, 1891; Здун, 1962, 1963; Кузьмович, 1963, 1968; Стадниченко, 1966, 1967а; Гладунко, 1968). Эти причины и побудили нас предпринять настоящее исследование.

До 1964 г. в литературе для западных областей УССР приводится 48 видов пресноводных гастропод. В 1964—1968 гг. мы занимались изучением фауны и экологии брюхоногих моллюсков из водоемов различных природно-географических зон западных областей УССР: Западноукраинского Полесья, Западноукраинской Лесостепи, Прикарпатья, Украинских Карпат и Закарпатья** (в пределах Волынской, Тернопольской, Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей). В ходе этих исследований число известных видов пресноводных гастропод западных областей УССР возросло до 49. Вид *Galba occulta* Jackiewicz, 1959 в СССР был найден впервые (Стадниченко, 1968).

В зоогеографическом отношении фауна пресноводных гастропод западных областей УССР очень неоднородна, что нетрудно понять, приняв во внимание исторические причины. В ее составе можно выделить следующие зоогеографические группы ***. Голарктические виды

* Цит. по Маркевичу (1960).

** Природно-географическое районирование западных областей УССР дано по П. Т. Ващенко (1959).

*** Зоогеографическое районирование и принадлежность видов к зоогеографическим группировкам приняты по Я. И. Старобогатову (1965).

в водоемах исследуемой территории не очень многочисленны: *Lymnaea stagnalis*, *Galba truncatula* и *Armiger crista*. Палеоарктические виды представлены более обильно *Physa fontinalis*, *Ph. acuta*, *Radix auricularia*, *R. pereger*, *R. ovata*, *R. lagotis*, *Galba palustris* var. *corvus*, *G. p.* var. *turricula*, *Gyraulus albus*, *G. laevis*, *G. acronicus*, *Aplexa hypnorum*, *Acrolochus lacustris*, *Valvata pulchella*, *Viviparus contectus*. Европейско-сибирские виды: *Anisus leucostoma*, *A. contortus*, *A. vortex*, *Hippeutis complanatus*, *Coretus corneus*, *Planorbis planorbis*, *Valvata piscinalis*, *Val. cristata*, *Bithynia tentaculata*, *B. leachii*, *Amphipeplea glutinosa*. Европейские виды: *Viviparus viviparus* и *Ancylus fluviatilis*. К этой же группе условно (поскольку ареал этого вида не изучен в достаточной степени) можно отнести и *Galba occulta*, описанный из водоемов Юго-Западной Польши Яцекевич (Jackiewicz, 1959), найденный в последующие годы в Чехословакии (Lozek, 1960; Hudec, Brabec, 1966), в других районах Польши (Czapski, 1962, 1965), а также, как отмечалось выше, в западных областях Украины. Балтийские виды представлены эндемиками Балтийской провинции: *Galba glabra* и *Anisus vorticulus*. Западноевропейские виды: *Theodoxus fluviatilis*, *Lithoglyphus naticoides*, *Planorbis carinatus*, *Anisus spirorbis*, *A. septemgyratus*. Западнопричерноморские виды — это в основном эндемики Дунайско-Донской провинции: *Theodoxus danubialis*, *Bythinella austriaca*, *Byth. hungarica*, *Fagotia acicularis* и *F. esperi*. Кроме того, к этой же группе, вероятно, следует отнести и *Theodoxus dniestrovensis*, описанный А. Л. Путем (1957) из Среднего Днестра (с. Рухотин) и обнаруженный нами в Днестре у с. Атаки (другие местонахождения этого вида пока не известны). Необходимо также отметить, что по территории западных областей УССР проходит восточная граница ареала *Bythinella austriaca* и *Byth. hungarica* и северная граница распространения *Fagotia acicularis* и *F. esperi*.

Таким образом, в фауне западных областей Украины гастроподы водоемов представлены различными зоogeографическими группами. Наиболее многочисленны из них — палеоарктическая и европейско-сибирская (каждая включает 1/4 общего числа видов).

В результате исследований установлено также, что наибольшее разнообразие видов характерно для Прикарпатья и Западноукраинской Лесостепи (45 и 43 вида соответственно), а наименьшее — для Карпат (10 видов). В водоемах Западноукраинского Полесья обнаружено 37 видов гастропод, два из которых — *Amphipeplea glutinosa* и *Gyraulus laevis* впервые найдены здесь. В этой зоне чаще всего встречались виды из семейств прудовиковых (*Lymnaeidae*), катушковых (*Planorbidae*) и гидробиид (*Hydrobiidae*). Первое место принадлежало, безусловно, моллюскам семейства катушковых, которые очень характерны для малакофауны Полесья. Среди полесских гастропод доминирующими видами являлись *Lymnaea stagnalis*, *Coretus corneus*, *Radix auricularia* и *Planorbis planorbis**. Остальные виды равномерно распределялись между группами второстепенных и третьестепенных.

В фауне брюхоногих моллюсков Западноукраинской Лесостепи насчитывается 43 вида. Как и в водоемах Западноукраинского Полесья, в этой зоне особенно широко распространены представители семейств прудовиковых, катушковых и гидробиид. Однако при богатом видовом составе малакофауны количество доминирующих видов здесь относительно невелико: *Lymnaea stagnalis*, *Radix auricularia*, *Coretus corneus*.

* К доминирующему видам отнесены те, которые составляли свыше 10% общего числа видов; к второстепенным — от 1 до 10%; к третьестепенным — менее 1%.

Новыми для этой зоны видами оказались *Galla glarba* и *G. occulta*. Что же касается *Physa acuta*, то в пределах Западноукраинской Лесостепи (г. Сокаль Львовской обл.) этот вид был обнаружен Красуцким (Krasucki), о чем свидетельствуют раковины собранных им моллюсков, хранящиеся в фондах Государственного природоведческого музея АН УССР (г. Львов). Однако сведения о нахождении *Ph. acuta* на территории Западноукраинской Лесостепи остались неопубликованными.

Наиболее богата фауна пресноводных гастропод в Прикарпатье, в водоемах которого насчитывается 45 видов. Среди них новыми для этой зоны являются *Radix lagotis*, *Galba occulta* и *G. acronicus*. Число видов в Прикарпатье возрастает по сравнению с предыдущей зоной в основном за счет моллюсков семейства лунковых (Neritidae). Интересно, что при большом качественном разнообразии фауны гастропод водоемов Прикарпатья в ней нет доминирующих видов.

Фауна пресноводных брюхоногих моллюсков Украинских Карпат бедна. Из 10 представляющих ее видов четыре — *Galba palustris* var. *turricula*, *Anisus vorticulus*, *Gyraulus acronicus* и *Valvata pulchella* — зарегистрированы впервые. В этой зоне мы не встречали видов семейств пузырчиковых (Physidae), живородковых (Viviparidae), чернушковых (Melaniidae) и лунковых. По сравнению с другими зонами беднее представлены семейства прудовиковых и катушковых. В то же время есть виды, которые в СССР не встречаются нигде за пределами Карпат — *Bythinella austriaca* и *Byth. hungarica*. В период исследования в водоемах Карпат доминировали *Ancylus fluviatilis* и *Galba truncatula*.

К настоящему времени в водоемах Закарпатья известно 24 вида брюхоногих моллюсков. Однако малакофауна Закарпатья не изучена еще в достаточной степени. Поэтому вполне вероятно, что в результате дальнейших исследований число видов гастропод несколько возрастет, скорее всего, за счет мелких видов семейств катушковых и затворковых (Valvatidae). Доминирующими видами в этой природно-географической зоне были *Radix auricularia*, *Lithoglyphus naticoides* и *Ancylus fluviatilis*. Новым для Закарпатья видом является *Physa acuta*.

В илистых и песчано-илистых биотопах, столь характерных для больших и малых рек западных областей Украины, а также для рукавов, затонов и стариц, количественно преобладают пелофильные и фитофильные формы — *Lymnaea stagnalis*, *Radix auricularia*, *Planorbis planorbis*, *Coretus corneus*, *Physa fontinalis*, *Viviparus viviparus*, *Valvata piscinalis* (110—350 экз./м²). В песчаных биотопах обычны *Fagotia aciculalis*, *F. esperi*, *Lithoglyphus naticoides* (до 400 экз./м²), а в составе близкореофильных биоценозов — *Theodoxus fluviatilis* (100—180 экз./м²). Довольно часто встречаются здесь хотя и в меньшем количестве, чем уже названные виды, *Padix auricularia*, *R. ovata*, *R. pereger*. В глинистом биотопе — узкой полоске дна у размываемого течением глинистого берега — чаще всего обитают *Radix auricularia*, *R. ovata*, *R. pereger*, реже — *Coretus corneus*. На каменистых и галечно-каменистых грунтах карпатских рек очень многочисленны *Anisus fluviatilis* (85—195 экз./м²) и *Radix pereger* (105—154 экз./м²).

В озерах преобладают зарослевые биотопы. В них большой численности достигают *Limnaea stagnalis*, а также мелкие *Planorbidae*, плотность поселения которых в среднем составляет 400—500 экз./м², а иногда достигает 10 000 экз./м². В псаммофильных биоценозах обычны виды рода *Lymnaea* (35—48 экз./м²).

В естественных и искусственных прудах на мягкой растительности высокая плотность поселения характерна для таких фитофильных видов,

как *Limnaea stagnalis*, *Coretus corneus*, *G. corvus*, *G. turricula*, мелких *Planorbidae*, *Physa fontinalis* (50—125 экз./м²).

В водоемах астатического типа обитает 22 вида гастропод, представляющих семейства прудовиковых, пузырчиковых, катушковых и гидробиид. Малакофауна этих биотопов бедна по составу, но плотность поселения некоторых видов очень высока. Например, плотность поселения *Planorbis planorbis* в этих водоемах достигала 24 000 экз./м² (Стадниченко, 1967б).

В источниках Карпат, как правило, встречались *Bythinella austriaca* и *Byth. hungarica*. Плотность их популяций в литореофильных биоценозах достигала 200—400 экз./м².

ЛИТЕРАТУРА

- Ващенко П. Т. 1959. До питання про природно-історичне районування Львівської області. Геогр. сб. Львов. ун-та, в. 1.
- Гитилис В. С. 1952. Материалы к биологии прудовика малого (*Galba truncatula Müller*) в связи с фасциолезом скота. Уч. зап. Чернов. гос. ун-та, т. 9, в. 3.
- Гладунко И. И. 1968. Некоторые вопросы экологии водных моллюсков — промежуточных хозяев сангвинников в условиях западных областей Украины. В сб.: «Моллюски и их роль в экосистемах», Л.
- Жадин В. И. 1929. Заметка о моллюсках из реки Днестр. Рус. гидробиол. журн., т. 8.
- Его же. 1952. Моллюски пресных и солоноватых вод СССР. М.—Л.
- Здун В. И. 1954. Биотопы малого прудовика *Galba truncatula* Müll. на территории Восточных Карпат. В сб.: «Фауна и животный мир Советских Карпат», Ужгород.
- Его же. 1958. Моллюски Карпат и особливості їх поширення. Докл. ВОГ, М.
- Его же. 1960. Фауна моллюсків Закарпаття. Зап. наук.-прир. музею АН УРСР, т. 8.
- Его же. 1962. Некоторые вопросы экологии наиболее распространенных моллюсков Западного Полесья. В сб.: «Вопросы экологии», т. 5, К.
- Его же. 1963. Биотопы моллюсків родини *Planorbidae* в західній частині Українського Полісся. В сб.: «Сучасна та минула фауна західних областей України». К.
- Иванчик Г. С. 1964. Эколого-географическая характеристика пресноводных моллюсков Карпат и Прикарпатья. XX науч. сесс. Чернов. гос. ун-та, тез. докл. Черновцы.
- Его же. 1965. Пресноводные моллюски Восточных Карпат и Прикарпатья (в пределах СССР) и их хозяйственная оценка. В сб.: «Вопросы теоретической и прикладной малакологии». Л.
- Кузьмович Л. Г. 1963. Динамика развития *Fasciola hepatica* L. и его промежуточного хозяина — моллюска *Galba truncatula* на природных пастбищах Украинских Карпат. В сб.: «Гельминты животных, человека и растений и борьба с ними». М.
- Его же. 1968. О суточной активности моллюска *Galba truncatula* Müller в условиях высокогорья Карпат. В сб.: «Моллюски и их роль в экосистемах». Л.
- Маркевич А. П. 1960. Нарис історії вивчення фауни Українських Карпат і прилеглих територій. В сб.: «Флора и фауна Карпат». М.
- Полянский Ю. 1932. Материалы до пізнання малакофауни Західного Полісся. Зб. фізіографічн. наук товариства ім. Шевченка, Львів.
- Путь А. Л. 1957. До лізнаття фауни прісноводних моллюсків Української РСР. Тр. Ин-та зоол. АН УССР, т. 14.
- Стадниченко А. П. 1966. Про сезонну активність молюска вушкового ставковника (*Limnaea auricularia*) в умовах Прикарпаття. XI наук. конф. Львів. дер. ун-ту. Тези допов. Львів.
- Стадниченко А. П. 1967 а. О зараженности брюхоногих моллюсков (*Gastropoda*) водоемов западных областей Украины личинками trematod. «Проблемы паразитол.». К.
- Ее же. 1967 б. К распространению и экологии ушкового прудовика в водоемах западных областей Украины. Мат-лы III зоол. конф. Пед. ин-тов РСФСР. Волгоград.
- Ее же. 1968. *Galba occulta* Jackiewicz, 1959 — новый вид фауны СССР. Зоол. журн., т. XLVII, в. 6.
- Старобогатов Я. И. 1965. Зоогеографическая характеристика фауны континентальных водоемов СССР. Автореф. канд. дисс. Л.
- Черемисина В. Т. 1959. Пресноводные моллюски Советской Буковины. Тр. эксп. по комплексн. изуч. Карпат и Прикарпатья, т. 7, К.
- Adamowicz J. 1937. Materiały do fauny Polesia, Międzysieki powiatu Pińskiego. Spraw. Tow. Przyr. Nauk., т. 2.
- Его же. 1939. Materiały do fauny mięczaków Polesia. Fragm. Faun. Mus. Zool. Pol., т. 4 № 3.

- Babor I. F., Frankenberger I. F. 1914. Zur Kenntnis der Karpathischen Weichtiere. Verhand zool.-botan. Gesel. in Wien, Bd. 64.
- Bakowski J. 1878. Slimaki i malże zebrane w okolicy nadbużańskiej kolo Kamionki Strumiłowej w r. 1877. Spraw. Kom. Fiz., t. 12.
- Ero же. 1878 a. Slimaki i malże z okolic Strzyżowa zebrane w r. 1876. Spraw. Kom. Fiz., t. 12.
- Ero же. 1879. Mięczaki z okolic Bóbrki i Przemyślan. Spraw. Kom. Fiz., t. 13.
- Ero же. 1880. Mięczaki zebrane w gorach Mikyliczyńskich i na Czarnohorze. Pam. Tow. tatrz.
- Ero же. 1880 a. Mięczaki zebrane na Podoli w lipcu i sierpniu r. 1879. Spraw. Kom. Fiz., t. 14.
- Ero же. 1881. Mięczaki zebrane na Podolu na stepie Pantalichy i w Toutrach w r. 1880. Spraw. Kom. Fiz., t. 15.
- Ero же. 1882. Mięczaki zebrane z okolicy Lwowa, Grodka i Szerca. Spraw. Kom. Fiz., t. 16.
- Ero же. 1882 a. Mięczaki z gór drohobyczskich, z okolicy Żórawna i Mikołajowa. Spraw. Kom. Fiz., t. 16.
- Ero же. 1882 b. Mięczaki zebrane w lipcu i sierpniu w okolicy Kolomyi, Mikulicyna i Zabiego i na Czarnohorze, oraz ich pionowe rozmieszczenie. Lwów.
- Ero же. 1883. Mięczaki tatarskie, Kosmos. Lwów.
- Ero же. 1885. Mięczaki Galicyjskie. Lwów.
- Bakowski J., Lomnicki A. 1891. Mieczaki muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie. Lwów.
- Clessin S. 1887. Die Molluskenfauna Oesterreich — Ungarns der Schweiz. Nurnberg.
- Czapski Z. 1962. The snail *Galba occulta* Jackiewicz, 1959 — another intermediate host of *Fasciola hepatica* L. Z. Tropenmedizin. Parasitol., t. 13, № 3.
- Ero же. 1965. Z badań nad *Galba occulta* Jackiewicz, 1959 — nowego żywiciela posredniego *Fasciola hepatica* L. Wiadom. parazytol., t. 11.
- Dybowski B. 1898. Switez, Kosmos. Lwów.
- Hudec V., Brabenee J. 1966. Neue Erkenntnisse über die Schnecken der der g Gesamtart *Galba palustris* (Müller, 1774) aus der Tscheslowakei. Folia parasitol. Bd. 13. Praha.
- Jachno J. 1870. Materyaly do fauny Galicyjskiej malako-zoologicznej. Kraków.
- Jackiewicz M. 1959. Badania nad zmiennością i stanowiskiem systematycznym *Galba palustris* Müll. Prac. Kom. Biol. Poznań, t. 19, № 3.
- Kotula B. 1881. Wykaz mięczaków zebranych w okolicach Przemyśla, tudzież w dorzeczu górnego Strwiąza i Sanu. Kraków.
- Ero же. 1884. O pionowym rozsiedleniu mięczaków tatrzańskich. Spraw. Kom. Fiz., t. 18.
- Król Z. 1877. Mięczaki ladowe i słodkowodne ze stoków głównego działu i przyległych temuż nizu polnocno-europejskiego w Galicyi wschodniej. Spraw. Kom. Fiz., t. 11.
- Lindholm W. A. 1908. Materialien zur Molluskenfauna von Sudwesterussland Polen der Krim. Zan. Новорос. об-ва естествонсп., т. 31. Одесса.
- Łożek W. 1960. Malakozoologicke noinky CSR. Casop. Narodn. Mus., t. 129.
- Poliński W. 1917. Materyaly do fauny malakologicznej Królestwa Polskiego, Litwy i Polesia. Nakl. Tow. Nauk. Warszawa.
- Urbański J. 1933. Mięczaki z okolic Rauwy Ruskiej i z kilku innych miejscowości na Roztoczu Lwowsko-Tomaszowskim. Spraw. Kom. Fiz., t. 67.

Поступила 1.VII 1969 г.

REVIEW OF FAUNA AND ECOLOGY OF GASTROPODA FROM THE WESTERN REGIONS OF THE UKRAINE

A. P. Stadnichenko

(Technical Institute of Fishing Industry and Fishery, Astrakhan)

Summary

Fauna, ecology and distribution of Gastropoda were studied in different natural-geographical zones in the western regions of the Ukraine. One species — *Galba occulta* Jackiewicz, 1959 new for the USSR fauna is found. For the first time two species are mentioned for West-Ukrainian Polesie, two — for West-Ukrainian Forest Steppe, three — for Forecarpathia, four — for the Ukrainian Carpathians and one — for Transcarpathia. The characteristic of malacofauna of each natural geographical zone is given, the data on mollusk ecology are presented. In the fauna composition of Gastropoda the following zoogeographical groups can be distinguished: holarctic, paleoarctic, European-Siberian, European, Baltic, West-European and Western Black Sea species.