

ОРНИТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

КРЫМ

О находках новых и редких видов птиц в Крыму.— При отлове воробышных птиц на п-ове Тарханкут в период весенних и осенних миграций встречены: средиземноморская славка (*Sylvia melanocephala*). Одиночный самец отловлен паутинной сетью 9.04.1991 г. После поимки держался в районе стационара несколько дней, пел, демонстрируя брачную активность, но ни гнезда, ни другие особи не обнаружены. 13.04. был отловлен повторно. Вид впервые отмечен для Крыма, Украины и СНГ. Рыжегрудая славка (*Sylvia cantillans*). Отловлены 2 самца 25.04.1990 г. (тушка хранится в фондах Института зоологии АНУ) и 8.05.1990 г. (тушка хранится в фондах Азовово-Черноморской орнитологической станции). Это вторая и третья встречи вида на территории Украины и первая в Крыму. Красноголовый сорокопут (*Lanius senator*). В Крыму редкий залетный вид, трижды добывался (Костин, 1983 г.). 21.04.1989 г. в р-не с. Оленевка учтено 12 особей, которые держались рассредоточено. Одна из этих птиц была отловлена и закольцована. Еще одна птица была отловлена 24.04.1990 г. и два самца — 25.04. и 1.05.1991 г. Белозобый дрозд (*Turdus torqueatus*). Отловлены 3 молодые самки 13.04, 3.10 и 10.10.1990 г. Ю.Ю. Костин (1983) указывает на перегуляриные залеты в Крым до 1949 г. Красноголовый королек (*Regulus ignicapillus*). 9.04.1990 г. отловлен молодой самец. Гнездится в горном Крыму. Вне гнездовых территорий в Крыму отмечался лишь однажды (Костин, 1983). Рыжепоясничная ласточка (*Hirundo daurica*). Две птицы, пролетавшие на с.-з. на высоте около 50 м, определены группой наблюдателей 16.04.1990 г. В Крыму известен один случай отстрела и 2 случая встреч (Костин, 1983).— Ю.А. Андрющенко, Е.А. Дядичева, А.Б. Граниченко, А.М. Полуда, В.М. Попенко, С.П. Прокопенко, И.И. Черничко, Р.Н. Черничко (Институт зоологии АНУ, Азовово-Черноморская орнитологическая станция).

Сипуха (*Tito alba*) в Крыму.— 24.09.1989 на Тарханкутском п-ове в окр. с. Оленевка во время охоты с ловчим ястребом-тетеревятником была отловлена одиночная особь. Промеры: длина крыла 292, хвост 117 мм. Ближайшие точки гнездования в Молдавии и западной Украине.— С.В. Домашевский (Институт зоологии АНУ Украины).

Гнездовые пищухи (*Centhia familiaris*) в Херсонской обл.— В заповедном уроцище «Акациевый лес» Голопристанского лесхоззага 7.05.1992 г. найдено гнездо, в котором птица насаживала кладку из 5 яиц. Основной причиной проникновения этого вида на Нижнеднепровскую песчаную арену является создание лесных массивов.— Н.Г. Пирогов.