

*Arvicola scherman* (Rodentia, Arvicolidae) в Прикарпатье. Вид, традиционно обозначаемый как «горная форма водяной полевки», — один из трех видов млекопитающих (также *Chionomys nivalis* и *Terricola tatricus*), распространение которых в Восточной Европе ограничено горными районами Карпат. В отличие от более крупной *A. amphibius* у *A. scherman*  $L=130-175$ ,  $Ca=63-93$ ,  $Pl=22-28$ ,  $Sbl=32-38$ ,  $M13=8-9$  мм, толщина скуловой дуги до 2,5 мм, затылочная площадка округло-покатая, задний отдел твердого неба с развитым срединным отростком. Все прежние находки вида относятся к высотам более 500 м (Загороднюк, 1992).

Исследование коллекционных сборов «*Arvicola terrestris*» зоологического музея Киевского университета позволило установить значительно более широкие пределы географического распространения вида. Наибольший интерес представляют экземпляры *A. scherman* с левобережных районов Днестра (leg. Татаринов, 1949—1950 гг.): 2♂ с окр. с. Отыневичи (4 км севернее Ходорова) и 3♂ из окр. с. Березец (5 км южнее Комарно) Львовской обл. Эти находки подтверждают указания на обитание *A. scherman* в долине Днестра, в окр. с. Раково и с. Розвадов Львовской обл. (Татаринов, 1956) и расширяют известный ареал вида на его левобережные районы — Подольскую возвышенность. Ближайшая находка *A. amphibius* на Днестре — ниже впадения Быстрицы в окр. с. Нижнев в Тлумачском р-не Ивано-Франковской обл. (9 экз., leg. Татаринов, Опалатенко, 1950—1951 гг.). Эти данные указывают на широкое распространение вида не только в горах, но и на прилегающей равнине и на существование симпатичных популяций этих двух видов *Arvicola*. — И. В. Загороднюк (Институт зоологии АН Украины, Киев).