

ЛИТЕРАТУРА

- Дядечко М. П., Сікура А. И., Сікура Л. В. Нематода *Hexameris* sp.— паразит колорадського жука в Закарпатській області. В кн.: Колорадський жук та нові методи боротьби з ним, т. XII, К., Держсільгоспвидав, 1963, с. 126—127.
- Рубцов И. Н., Коваль Ю. В. Мермитиды из колорадского жука.— Труды ВИЗР, 1975, вып. 44, с. 126—153.
- Abraham R. Mermithiden als Parasiten des Kartoffelkäfers (*Leptinotarsa decemlineata* Say)— Z. f. Pflanzenkrankheit (Pflanzenpat.) und Pflanzenschutz, 1938, 48, p. 507—513.
- Gleiss H. G. W. Der Knäuelwurm *Hexameris cornuta* nov. spec. (Mermith., Nemat.), als Endoparasit des Kartoffelkäfers (*Leptinotarsa decemlineata* Say).— Zool. Anzeiger, 1955, Bd. 5—6, S. 139—143.

Украинский институт
защиты растений

Поступила в редакцию
20.III 1977 г.

УДК 595.6

А. А. Джубанов, Б. В. Трощенко

О ЗАЛЕТАХ СТЕРВЯТНИКА (*NEOPHRON PERCNOPTERUS* L.) В СЕВЕРНЫЙ ПРИКАСПИЙ

В Казахстане стервятник (*Neophron percnopterus* L.) распространен на Мангышлаке, Устюрте и по горным отрогам к востоку от Аральского моря. Численность его невелика (Корелов, 1962). Э. Эверсманн (1866) писал, что эта хищная птица иногда залетает в степи Северного Прикаспия. В. Н. Бостанжогло (1911), ссылаясь лишь на данные Э. Эверсмана, считал, что стервятник в пределах края встречается в качестве редкого залетного вида. Поскольку с середины прошлого столетия стервятник в Прикаспии исследователями не отмечался, то он, в настоящее время, не включается в фаунистические сводки края.

Этот редкий залетный вид в пределах Северного Прикаспия нами был встречен трижды. Единственный раз за 8 лет исследований в Тайсойганских песках стервятник был отмечен в урочище Кара-Куль в низовьях реки Уил (Гурьевская обл.) в последних числах мая 1963 г. Автомашина смогла подойти на 150—170 м к могильнику, на котором отдыхал хищник. Второй раз эта птица была встречена 25.VIII 1969 г. на юге Уральской обл. в 2 км к югу от пос. Харькино. На этот раз птицу удалось хорошо рассмотреть в 8-кратный бинокль с расстояния 50—60 м. В конце концов осторожная птица улетела в западном направлении к реке Багырдай. И, наконец, один стервятник постоянно обитал в августе — начале сентября 1971 г. в 5—9 км к северу от пос. Харькино в долине Урала.

Таким образом, проведенные наблюдения позволяют сделать вывод, что стервятник в пределах Северного Прикаспия является редким залетным видом.

ЛИТЕРАТУРА

- Бостанжогло В. Н. Орнитологическая фауна Арало-Каспийских степей.— Мат-лы к познанию фауны и флоры Рос. имп., отд. зоол., 1911, вып. II, с.
- Корелов М. Н. Отряд Хищные птицы — Falconiformes. В кн.: «Птицы Казахстана», т. 2. Алма-Ата, 1962, с.
- Эверсманн Э. Естественная история Оренбургского края. Часть 3. В кн.: Естественная история птиц Оренбургского края. Казань, 1866.

Уральский пединститут

Поступила в редакцию
3.X 1977 г.