

ЗАМЕТКА

Про поширення мишей роду *Sylvaemus* на Лівобережній Україні [About Distribution of the Genus *Sylvaemus* in Livoberezhnaya Ukraine]. — Вважалося, що на Лівобережній Україні, зокрема у Полтавській та Чернігівській обл., поширені миша лісова (*Apodemus sylvaticus*) та миша жовтогорла (*A. flavicollis*). Після проведеної С. В. Межжеріним у 1997 р. ревізії роду *Apodemus*, лісових мишей виділено в окремий рід — *Sylvaemus*, який теоретично у Полтавській та Чернігівській обл. представлений 3 видами — миша лісова звичайна (*Sylvaemus sylvaticus*), миша лісова мала (*S. uralensis*) і миша жовтогорла (*S. tauricus*). Нами у 1997–1999 рр. при обліку дрібних ссавців у Кобеляцькому та Решетилівському р-нах Полтавської обл. та на околицях м. Полтава, а також в Бобровицькому, Срібнянському, Короському та Новгород-Сіверському р-нах Чернігівської обл. було відловлено 155 особин — представників роду *Sylvaemus*. Визначення видів проводилось за діагностичними ознаками (Межжерін, 1997), за якими вони достовірно відрізняються. Аналіз показав, що серед представників роду *Sylvaemus* у відловах 87,7% припадає на долю миші лісової малої (*S. uralensis*) і 12,3% — миші жовтогорлої (*S. tauricus*). Останнє свідчить про те, що абсолютним домінантом у зазначених районах Полтавської та Чернігівської обл. є миша лісова мала, миша жовтогорла значно поступається їй у чисельності, а миша лісова звичайна якщо і зустрічається, то у мізерній кількості. — С. М. Шевченко (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ).

ЗАМЕТКА

Нові дані щодо поширення меланізму у хом'яка звичайного (*Cricetus cricetus*) в Лівобережній Україні [New Data about Distribution of Hamster (*Cricetus cricetus*) Melanism in Livoberezhnaya Ukraine]. — З літературних джерел відомо, що територія Лівобережної України, де ступінь зустрічаємості меланістичної форми хом'яка звичайного висока, включає північно-східну частину Київської, південний схід Чернігівської і північний захід Полтавської обл. (Самош, 1978). Проведені дослідження ссавців у межах Полтавської обл. в 1998–1999 рр. дозволили встановити, що хом'як повсюдно є рідкісним і зареєстрований лише в одному пункті. Це — залишений хутір, який знаходиться неподалік від с. Ганжі Решетилівського р-ну (центральна частина області). З 9 особин, які були відмічені в агроценозах, 4 особини були меланістами, що становить 44% загальної кількості зареєстрованих тварин. Два екземпляри знаходяться у музейних колекціях, ще двох особин спостерігали візуально. Наведені дані свідчать про те, що ареал меланістів розширюється на південний схід області, і цілком відповідають даним С. М. Гершензона (1946), який наводить для Полтавської обл. найбільшу частоту зустрічаємості меланістичної форми хом'ячка порівняно з іншими областями України. — С. М. Шевченко (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ).