

ЗАМЕТКА

Нові дані до поширення деяких рідкісних видів ссавців (Mammalia) у Донецько-Приазовських степах (Східна Україна) [New Data on the Distribution of Some Rare Mammalian Species in Donetsk-Azov Steppe (Eastern Ukraine)]. — Під час польових досліджень 1994–2000 рр., нами були виявлені нові місця мешкання 3 видів ссавців, що занесені до Червоної книги України (1994). Нетопир середземноморський — *Pipistrellus kuhlii* (Kuhl, 1817). Як раніше повідомлялось, цих звірків було знайдено у с. Герасимівка Станично-Луанського р-ну Луганської обл. (Кондратенко, 1999). Також тварин цього виду було знайдено під час зимівлі у вентиляційних шахтах та між рамами вікна одного з ліцеїв м. Луганська (3 особини). Тушкан великий — *Allactaga major* (Pallas, 1778). Виявлено декілька місць поселення цього виду: 1) околиці с. Тараківка Троїцького р-ну Луганської обл. (дуже рідкісний); 2) околиці с. Марківка Луганської обл. (рештки 4 звірків знайдені у пелетках пугача — *Bubo bubo*); 3) степові ділянки між селами Зориківка та Півневка Міловського р-ну Луганської обл. (дуже рідкісний); 4) околиці с. Провалля Свердловського р-ну Луганської обл. (охоронна зона та заповідна територія заповідника «Провальський степ» — малочисельний); 5) околиці с. Степове Волновахського р-ну Донецької обл. (степові ділянки на північний схід від кургану Могила Цибіково — досить звичайний); 6) степові ділянки між селами Федорівка та Українка Володарського р-ну Донецької обл. (рідкісний); 7) Куликівський полігон між м. Урзуф (Донецька обл.) та с. Куликівське (Запорізька обл.) — доволі звичайний. Перегузня — *Vormela peregusna* (Guldenstaedt, 1770). Цих, дуже рідкісних для теренів України представників родини кунових (Mustelidae), було знайдено: 1) с. Герасимівка Станично-Луганського р-ну Луганської обл. (у 1999 р. — 1 особину, у 2000 р. — 2 особини); 2) смт Станично-Луганське Луганської обл. (у 2000 р. — 1 особину); 3) околиці с. Провалля Свердловського р-ну Луганської обл. (охоронна зона Калинівської ділянки заповідника «Провальський степ»; у 2000 р. — 4 особини); 4) околиці сел Федорівка та Українка Володарського р-ну Донецької обл. (у 1998–1999 рр. — поодинокі зустрічі). Усі зустрічі тварин були у населених пунктах, таким чином цей вид має схильність до синантропізму. — **О. Кондратенко** (Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, Київ), **Б. Мельниченко** (Донецький державний університет).