



ЗАМЕТКИ

Новые находки редких и малоизвестных видов Lasiocampidae (Lepidoptera) в Украине [New Finds of Rare and Little Known Species of Lasiocampidae (Lepidoptera) in Ukraine]. — При обработке мемориальной коллекции В. А. Барсова, хранящейся в энтомологическом фонде Днепропетровского национального университета им. Олеся Гончара, была обнаружена серия экземпляров (4 ♂ и 5 ♀) *Eriogaster neogena* (Fischer von Waldheim, 1824). Экземпляры снабжены рукописной этикеткой: «17.08.1961, с. Войсковое»; т. е. в районе байрачных лесов прежней порожистой части р. Днепр. В монографии Л. Г. Апостолова (1981) этот вид упомянут для территории области, однако автор не указал конкретных данных о месте и дате обнаружения. Вид включен в таблицу вредных дендрофильных насекомых лесных насаждений Центрального Приднепровья с пометкой: «в естественных байрачных лесах». Согласно другим источникам (Каталог чешуекрылых..., 2008), ближайшие местонахождения в Европе находятся в Волго-Донском регионе (Саратовская, Волгоградская и Ростовская обл.). По современным представлениям (Zolotuhin, 1995; Leraut, 2006), ареал вида охватывает юго-восточную Европу, Кавказ и Центральную Азию. Данная серия является единственной достоверной находкой *E. neogena* из Украины. Р. М. Величко 20.06.2008 на склоне южной экспозиции степной балки, в районе Днепропетровского международного аэропорта обнаружил 1 ♀ *Malacosoma franconicum* ([Denis et Schiffermüller], 1775). Ранее этот вид был достоверно отмечен в Украине лишь из АР Крым (Ефетов, Будашкин, 1990). — **К. К. Голобородько** (Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара), **И. Г. Плющ** (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев).

Первая находка *Brachyencyrtus pumilio* (Hymenoptera, Encyrtidae) в Украине [The First Record of *Brachyencyrtus pumilio* (Hymenoptera, Encyrtidae) in Ukraine]. — Особи *B. pumilio* (Hoffer, 1970) отловлены в Донецкой области: Володарский р-н, с. Назаровка, заповедник «Каменные Могилы», 21–26.09.2009, 20 ♀ (В. Фурсов) (ИЗШК). Род *Brachyencyrtus* Hoffer, 1959 представлен двумя видами: *B. araneoides* (Hoffer, 1957) и *B. pumilio*. Первый известен из Швеции, Чехии и Ленинградской обл. России и, вероятно, будет обнаружен и в Украине. Второй описан из Югославии и ранее нигде более не отмечался. Биология этих видов неизвестна. Представители трибы Microteryni Hoffer, к которой относится род *Brachyencyrtus* — паразитоиды и, изредка, хищники на отложенных яйцах кокцид (Homoptera, Coccoidea). — **С. А. Симутник** (Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, Киев).