

УДК 598.2 (477.60)

ДОПОЛНЕНИЯ К СПИСКУ ПТИЦ ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ**Тараненко Л.И., Садуло А.М., Прасол А.Г.***Донецкий государственный университет*

Some additions to the list of birds of the Donetsk region. Taranenko L.I., Sadulo A.M., Prason A.G. Donetsk State University.

The following species of birds were recorded in the Donetsk region. Lesser White-fronted Goose (Anser erythropus), Golden Eagle (Aquila chrysaetus), Lesser Kestrel (Falco naumanni), Syrian Woodpecker (Dendrocopos syriacus), Shore Lark (Eremophila alpestris) Lapland Bunting (Calcarius lapponicus), Citrine Wagtail (Motacilla citreola), Grey Wagtail (Motacilla cinerea), Black Redstart (Phoenicurus ochrurus), Isabelline Wheatear (Oenanthe isabellina), Stonechat (Saxicola torquata).

Пискулька (*Anser erythropus*) впервые отмечен на осеннем пролете 30.10.1990 г. Стаю, насчитывающую до 200 птиц, летевших в юго-западном направлении, наблюдали над г.Дзержинском. Беркутом (*Aquila chrysaetus*) оказался осмотренный нами 2.12.1991 г. раненый орел, подобранный местными жителями в окрестности с.Нетайлово Ясиноватского района. Степная пустельга (*Falco naumanni*) в количестве 3-5 пар ежегодно гнездится в меловых оврагах на правом берегу Северского Донца между селами Закотное и Кривая Лука Краснолиманского района.

Сирийский дятел (*Dendrocopos syriacus*) впервые отмечен в окрестностях Донецка в 1985 г. В настоящее время гнездится также в Славянске, Мариуполе, Горловке, Енакиево, Курахово и других населенных пунктах. Места гнездования - парки и тополево-ивовые насаждения у водоемов.

В отдельные годы отмечаются на зимовке рогатый жаворонок (*Eremophila alpestris*) и лапландский подорожник (*Calcarius lapponicus*). Горная трясогузка (*Motacilla cinerea*) почти регулярно зимует на незамерзающих ручьях и речках в Донецке и его окрестностях (1983-1985гг., 1987-1989гг., 1992г.). Отдельные встречи зарегистрированы в городах Зугрзе, Дзержинск, Славянск, на Старобешевском и Угледарском водохранилищах. В 1989 г две пары желтоголовой трясогузки (*Motacilla citreola*)загнездились на восточном берегу Краснооскольского водохранилища у с.Рубцы. В 1990 г. здесь гнездились уже 5 пар и шло расселение этого вида по пойме Северского Донца. В 1992г. впервые наблюдали гнездование горихвостки-чернушки (*Phoenicurus ochrurus*) на севере области в с. Старый Караван. В мае 1993 г. несколько пар горихвостки-чернушки загнездились в г. Донецке. Гнездование 4 пар каменик-плясуны (*Oenanthe isabellina*) обнаружено 25.05.89 на оспенном правом берегу р.Каратыш возле хутора Украинка в Володарском районе; расстояние между гнездами, расположенными в норах малого суслика, составляло от 50 до 300 м. В 1991 г. гнездовая численность не изменилась. Не представляет редкости на территории области черноголовый чекан (*Saxicola torquata*), спорадичность распространения которого объясняется связью с сухими балками, склонами, местами выпаса скота.